

Flekainidi ja Amiodaroni

- Varsinaiset rytmihäiriölääkkeet (flekainidi, amiodaroni, sotaloli) aloittaa sisätautilääkäri tai kardiologi
- Avoterveydenhuolto seuraa lääkitystä erikoissairaanhoidon ohjeistuksella

Rytmihäiriölääkkeiden turvakokeet

FLEKANIDI (Tambocor®)

- Erikoissairaanhoido tai erikoispoliklinikka aloittaa, jatkohoito avoterveydenhuollossa: 1-2 viikon kuluttua aloituksesta EKG. Lopeta lääkitys, jos QRS levenee > 30%
- Lopeta lääkitys myös silloin, jos ilmaantuu iskemiaa, sydämen vajaatoimintaa tai kammioartymiaa
- vuosittain avoterveydenhuollon kontrollit

Flekainidi on turvallinen itsenäisen eteisvärinän hoidossa mutta vasta-aiheinen sydäninfarktin sairastaneilla, sydämen vajaatoiminnassa ja muissa rakenteellisissa sydänsairauksissa.

Amiodaroni (Cordarone®)

Amiodaroni hoito aloitetaan erikoissairaanhoidossa ja hoitovastuu on erikoissairaanhoidolla.

	Ennen hoidon aloittamista	3 kk	Jatkoseuranta (6kk välein)	Oireiden ilmaantuessa
EKG	X	X	X	X
Keuhkojen toimintakokeet (spirometria+diffuusiokoe)	X		X (kerran vuodessa)	X
Thoraxkuvaus	X			X
Verikokeet (TVK, TSH, T3V, ALAT, Na, K, Krea) (1)	X	X	X	
Silmälääkärin tutkimus				X

(1) Akuutisti sairailta potilailla maksa-arvot saattavat nousta jo lyhyen laskimonsisäisen annon jälkeen, minkä takia eteenkin tehohoidossa olevien potilaiden transaminaasipitoisuuksia kannattaa seurata jo laskimonsisäisen kyllästyshoidon aikana

Kardiologia, 3. uudistettu painos, Kustannus Oy - Duodecim 2016. UpToDate 2022.