

## PRADAXA JA SÄHKÖINEN RYTMINSIIRTO

Teille on määrätty Pradaxa – lääkitys estämään eteisvärinään ja rytminsiirtoon liittyvää aivohalvauksen riskiä. Pradaxa (dabikatraanieteksilaatti) on veren hyytymiseen vaikuttava lääke. Se ehkäisee verihyytymien syntymistä.

### Miksi lääke täytyy ottaa säännöllisesti?

Lääke on tärkeää ottaa säännöllisesti, jotta sen teho aivohalvauksen estämiseksi saavutetaan. Kapseli otetaan aamuin ja illoin kokonaisena veden kanssa, joko ruoan kanssa tai ilman. Älä riko tai pureskele kapselia, äläkä tyhjennä kapselin sisältöä. Jos unohdat ottaa Pradaxan, unohtunut annos voidaan vielä ottaa, jos seuraavaan annokseen on vähintään kuusi (6) tuntia. Jätä unohtunut annos väliin, jos seuraavaan annokseen on alle kuusi (6) tuntia.

**TÄRKEÄÄ:** Jos annos jää väliin, tulee asiasta ilmoittaa rytminsiirrosta vastaavaan yksikköön mielellään heti seuraavana arkipäivänä (puh. 044 719 5537 arkisin klo 9 - 14). Lääkehoito on tarkoitettu jatkumaan lääkärin antaman määräyksen mukaisesti, kuitenkin vähintään 4 viikkoa rytminsiirron jälkeen.

### Mikä on sähköinen rytminsiirto?

Rytminsiirrosta palautetaan sydämen rytmi kevyen, lyhytaikaisen nukutuksen aikana sähköiskulla. Toimenpide on kivuton.

Pradaxa –annokseni \_\_\_\_\_ Pradaxan aloituspäivä \_\_\_\_\_

Päivä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Aamu																						
Ilta																						

Päivä	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Aamu																						
Ilta																						

Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle.

Rytminsiirto tehdään noin 4 viikon kuluttua. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan erikseen kirjeellä.

Olen saanut ja ymmärtänyt ohjeistuksen.

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys

## OTA TÄMÄ KAAVAKE MUKAAN RYTMINSIIRTOON